



Bekæmpelse af Flæskeklanner. (BioVir)

- Forebyggende – Hvis man sprøjter området inden de udklækkes kan man holde dem nede.

Har man problemet i åbne forhold er det denne fremgangsmåde:

- Hvis Flæskeklannerne er kommet frem sprøjter man på 1. dagen og så igen på 3. dagen og er det i åbne områder (udenfor evt. under halvtag) gentages proceduren efter 20 dage, dvs. der sprøjtes 1. dag og dernæst 3. dag igen.
- Hvis de ikke er døde tager man turen igen efter yderligere 20 dage. 1 dags behandling og 3 dags behandling igen.

Har man problemet i lukkede forhold er det denne fremgangsmåde:

- Hvis Flæskeklannerne er kommet frem sprøjter man på 1. dag så igen på 3. dag og er det i lukkede område (indenfor) gentages proceduren efter 30 dage, dvs. sprøjtes 1. dag og dernæst på 3. dag igen.
- Hvis de ikke er døde tager man turen igen efter yderligere 30 dage. 1 dags behandling og 3 dags behandling igen.

Er ikke skadeligt for de dyrehold man har og kan derfor bruges omkring dyrene, evt. i redekasser.

BioVir må ikke opbevares under 10 grader!

